

# การบันทึกข้อมูลรายงาน จิตเวช

ต้องใช้ Smart Card โปรดใช้วิจารณญาณในการใช้ข้อมูล

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

- การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้รับคัดกรองความเครียด(ST-5)

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มโรคเรื้อรัง(คน)

อายุ 15-59 ปี รหัส	SPECIALPP	1B132=>ปกติ,
		1B133=>เครียด,
		1B134=>เครียดสูง
อายุ 60 ปีขึ้นไป รหัส	SPECIALPP	1B0286=> ปกติ,
		1B0287=> เครียด ,
		1B0288=> เครียดสูง

รหัสการการคัดกรองความเครียด ST5 แบ่งตามกลุ่มอายุดังนี้

สำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง จะไม่รวมการคัดกรองความเครียดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งแยกรายงานต่างหาก

สำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง

แฟ้ม person +ppspacial+chronic

มี DATA EXCHANGE

typearea in(1,3)

AND p.NATION in(99)

AND p.DISCHARGE in(9)

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

### การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในหญิงตั้งครรภ์

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ คัดกรองความเครียด

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ(คน)

รหัสการการคัดกรองความเครียด ST5 ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ คือ	1B142=>ปกติ ,	0-4
	1B143=>เครียด ,	5-7
	1B144=>เครียดสูง	8-15

- หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด/แท้งบุตร ในปีงบประมาณ
- ได้รับการคัดกรองขณะตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติย้อนหลังตั้งแต่ BDATE - 40 WEEKS ถึง BDATE
- ได้รับการคัดกรองหลังการตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติตั้งแต่ BDATE ถึง BDATE + 42 days
- สำหรับหลังการตั้งครรภ์อาจมีการบันทึกรหัสในประชาชนทั่วไป จะนับด้วย คือ รหัส 1B132=>ปกติ ,1B133=>เครียด ,1B134=>เครียดสูง

เพิ่ม person +ppspacial+Labor

มี DATA EXCHANGE

typearea in(1,3)  
AND p.NATION in(99)  
AND p.DISCHARGE in(9)

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

- การคัดกรองความเครียด(ST-5)ในกลุ่มผู้สูงอายุ

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุ(คน)

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุ คัดกรองความเครียด

รหัสการคัดกรองความเครียด(ST-5)ในกลุ่มผู้สูงอายุ คือ

1B0286=>ปกติ,	0-4
1B0287=>เครียด ,	5-7
1B0288=>เครียดสูง	8-15
1B1280=>ติดสังคม ,	
1B1281=>ติดบ้าน ,	
1B1282=>ติดเตียง	

รหัสการการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL)

## เพิ่ม person +ppspacial

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

age\_y >=60

## มี DATA EXCHANGE

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มโรคเรื้อรัง(คน)

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มโรคเรื้อรัง ได้รับคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)

อายุ 15-59 ปี รหัส SPECIALPP

1B130=>ปกติ,

1B131=>ผิดปกติ

อายุ 60 ปีขึ้นไป รหัส SPECIALPP

1B0280=>ปกติ

1B0281=>ผิดปกติ

สำหรับกลุ่มโรคเรื้อรัง จะไม่รวมการคัดกรองความเครียดในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งแยกรายงานต่างหาก

เพิ่ม `person +ppspacial+chronic`

`typearea in(1,3)`  
`AND p.NATION in(99)`  
`AND p.DISCHARGE in(9)`

**มี DATA EXCHANGE**

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในหญิงตั้งครรภ์

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ คัดกรองความเครียด

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ(คน)

รหัสการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ คือ

1B140=>ปกติ ,

1B141=>ผิดปกติ

- หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด/แท้งบุตร ในปีงบประมาณ
- ได้รับการคัดกรองขณะตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติย้อนหลังตั้งแต่ BDATE - 40 WEEKS ถึง BDATE
- ได้รับการคัดกรองหลังการตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติตั้งแต่ BDATE ถึง BDATE + 42 days
- สำหรับหลังการตั้งครรภ์อาจมีการบันทึกรหัสในประชาชนทั่วไป จะนับด้วย คือ รหัส 1B130=>ปกติ ,1B131=>ผิดปกติ

แฟ้ม person +ppspacial+Labor

มี DATA EXCHANGE

typearea in(1,3)

AND p.NATION in(99)

AND p.DISCHARGE in(9)

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

- การคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุ(คน)

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุ คัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q)

รหัสการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป	1B0280=>ปกติ
	1B0281=>ผิดปกติ
รหัสการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL)	1B1280=>ดีดสังคม
	1B1281=>ดีที่บ้าน

เพิ่ม person +ppspacial

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

age\_y >=60

มี DATA EXCHANGE

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

### การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

B หมายถึง ประชากรที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ผิดปกติ

A หมายถึง ประชากรที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ผลการคัดกรองโรคซึมเศร้า (2Q) ผิดปกติ ได้รับการประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)

### รหัสการการประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) แบ่งตามกลุ่มอายุดังนี้

อายุ 15-59 ปี รหัส SPECIALPP	1B0260=>ปกติ,	คะแนน < 7
	1B0261=>ซึมเศร้าน้อย ,	คะแนน 7-12
	1B0262=>ซึมเศร้าปานกลาง ,	คะแนน 13-18
	1B0263=>ซึมเศร้ารุนแรง	คะแนน >=19
อายุ 60 ปีขึ้นไป รหัส SPECIALPP	1B0282=>ปกติ,	คะแนน <7
	1B0283=>ซึมเศร้าน้อย ,	คะแนน 7-12
	1B0284=>ซึมเศร้าปานกลาง,	คะแนน 13-18
	1B0285=>ซึมเศร้ารุนแรง	คะแนน >=19

เพิ่ม person +ppspacial+chronic  
not in Labor

typearea in(1,3)  
NATION in(99)  
DISCHARGE in(9)

การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ตามแนวทางปฏิบัติงาน จะประเมิน 9Q ก็ต่อเมื่อมีผลของการคัดกรอง 2Q ผิดปกติ

สำหรับรายงานนี้ จะไม่รวมการประเมินในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์



## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

การประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในหญิงตั้งครรภ์

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ ที่ 2Q ผิดปกติ  
A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณที่ 2Q ผิดปกติ  
ได้รับการประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)

รหัสการการประเมินโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ คือ

1B0260=>ปกติ,

1B0261=>ซึมเศร้าน้อย ,

1B0262=>ซึมเศร้าปานกลาง ,

1B0263=>ซึมเศร้ารุนแรง

- หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ด้วยการคลอด/แท้งบุตร ในปีงบประมาณ
- ได้รับการคัดกรองขณะตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติย้อนหลังตั้งแต่ BDATE - 40 WEEKS ถึง BDATE
- ได้รับการคัดกรองหลังการตั้งครรภ์ ค้นหาประวัติตั้งแต่ BDATE ถึง BDATE + 42 days

สำหรับรายงานนี้ประมวลผลตามผังการปฏิบัติงาน คือ จะประเมิน 9Q จะต้องมีผล 2Q ผิดปกติจึงจะทำการประเมิน 9Q

แฟ้ม person +ppspacial+Labor

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

### การคัดกรองโรคซึมเศร้า (9Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุที่ 2Q ผิดปกติ (คน)

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุที่ 2Q ผิดปกติ ได้รับการประเมินโรคซึมเศร้า (9Q)

รหัสการคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับ  
ความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน(ADL)

1B1280=>ติดสังคม ,

1B1281=>ติดบ้าน ,

1B1282=>ติดเตียง

เพิ่ม **person +ppspacial**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

p.age\_y >=60

2q=1

มี DATA EXCHANGE

ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี  
การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

รหัสการการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) รหัส SPECIALPP

1B0270 => ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย

1B0271 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย

1B0272 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับปานกลาง

1B0273 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ตามแนวทางปฏิบัติงาน จะประเมิน 8Q ก็ต่อเมื่อมีผลของการประเมิน 9Q ผิดปกติ

แฟ้ม **person +ppspacial+chronic**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

p.age\_y >=60

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ตามแนวทางปฏิบัติงาน จะประเมิน 8Q ก็ต่อเมื่อมีผลของการประเมิน 9Q ผิดปกติ

**มี DATA EXCHANGE**

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในหญิงตั้งครรภ์

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณ ที่ 9Q ผิดปกติ

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในปีงบประมาณที่ 9Q ผิดปกติ ได้รับการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)

รหัสการการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) รหัส SPECIALPP

1B0270 => ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย

1B0271 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย

1B0272 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับปานกลาง

1B0273 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก

เพิ่ม person +ppspacial+Labor

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ตามแนวทางปฏิบัติงาน จะประเมิน 8Q ก็ต่อเมื่อมีผลของการประเมิน 9Q ผิดปกติ

มี DATA EXCHANGE

## ส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตข้อมูลระดับจังหวัด : จ.สุพรรณบุรี

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ในกลุ่มผู้สูงอายุ

B หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุที่ 9Q ผิดปกติ (คน)

A หมายถึง จำนวนประชากรในเขตรับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุที่ 9Q ผิดปกติ ได้รับการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q)

รหัสการการประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) รหัส SPECIALPP

1B0270 => ไม่มีแนวโน้มฆ่าตัวตาย

1B0271 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับน้อย

1B0272 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับปานกลาง

1B0273 => มีแนวโน้มฆ่าตัวตายระดับมาก

เพิ่ม person +ppspacial

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

AND p.age\_y >=60

9q=1

การประเมินการฆ่าตัวตาย (8Q) ตามแนวทางปฏิบัติงาน จะประเมิน 8Q ก็ต่อเมื่อมีผลของการประเมิน 9Q ผิดปกติ

มี DATA EXCHANGE

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

1. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ

**B** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)

**A** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด (คนต่อจังหวัด)

ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ป่วยจากแฟ้ม **Diagnosis\_opd** ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F32.x, F33.x, F34.1, F38.x** และ **F39.x** ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 สะสมมา

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE LIKE 'F32%'
OR CODE LIKE 'F33%'
OR CODE LIKE 'F34%'
OR CODE LIKE 'F38%'
OR CODE LIKE 'F39%'
```

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ

**B** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)

**A** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาในจังหวัด (คนต่อจังหวัด)

ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ หมายถึง ผู้ป่วยอายุ 15 ปีขึ้นไป (นับอายุ ณ วันที่รับบริการ)

จากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F20.0 -F20.9**

ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ที่มารับบริการ ตั้งแต่

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE BETWEEN 'F200' AND
'F209'
```

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ

**B** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)

**A** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)

ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ หมายถึง ประชากรเด็กอายุ 6-15 ปี (11 เดือน 29 วัน)

ที่มีอาการสอดคล้องกับโรคสมาธิสั้นจากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F90.0 -F90.9** ทั้งรายเก่าและรายใหม่

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE BETWEEN 'F900' and 'F909'
```

CODE	NAME	tname
F900	Disturbance of activity and attention	ความผิดปกติของกิจกรรมและความพอใจ
F901	Hyperkinetic conduct disorder	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ และกลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว
F908	Other hyperkinetic disorders	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติอื่น ๆ
F909	Hyperkinetic disorder, unspecified	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ สาเหตุที่มีได้ระบุรายละเอียด

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)



# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ

B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)

A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)

ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ หมายถึง ประชากรเด็กอายุ 2-5 ปี (11 เดือน 29 วัน)

ที่มีอาการสอดคล้องกับโรคออทิสติกจากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F84.0 -F84.9** ทั้งรายเก่าและ**รายใหม่**

CODE	NAME
F84	Pervasive developmental disorders
F840	Childhood autism
F841	Atypical autism
F842	Rett's syndrome
F843	Other childhood disintegrative disorder
F844	Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
F845	Asperger's syndrome
F848	Other pervasive developmental disorders
F849	Pervasive developmental disorder, unspecified

```
SELECT CODE,NAME,tname  
FROM icd101  
WHERE CODE BETWEEN 'F84' and 'F849'
```

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

typearea in(1,3)

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 5. ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ(workload)

- ผู้ป่วยหนึ่งคนรักษาหลายสถานพยาบาลได้
- จำนวนข้อมูลการรับบริการคนต่อสถานพยาบาลย่อมมากกว่าหรือเท่ากับ
- คนต่อจังหวัดในข้อตัวชี้วัด

แฟ้ม Person + service +Diagnosis\_Opd

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

AND p.age\_y >=15

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE LIKE 'F32%'
OR CODE LIKE 'F33%'
OR CODE LIKE 'F34%'
OR CODE LIKE 'F38%'
OR CODE LIKE 'F39%'
```

## ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช 6. ผู้ป่วยโรคจิตเภทเข้าถึงบริการ(workload)

จากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F20.0 -F20.9**

```
SELECT CODE,NAME,tname  
FROM icd101  
WHERE CODE BETWEEN 'F200' AND  
'F209'
```

- ผู้ป่วยหนึ่งคนรักษาหลายสถานพยาบาลได้
- จำนวนข้อมูลการรับบริการคนต่อสถานพยาบาลย่อมมากกว่าหรือเท่ากับ
- คนต่อจังหวัดในข้อตัวชี้วัด

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 7. ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ(workload)

**B** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)

**A** หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)

ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นเข้าถึงบริการ หมายถึง ประชากรเด็กอายุ 6-15 ปี (11 เดือน 29 วัน)

ที่มีอาการสอดคล้องกับโรคสมาธิสั้นจากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F90.0 -F90.9** ทั้งรายเก่าและรายใหม่

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE BETWEEN 'F900' and 'F909'
```

CODE	NAME	tname
F900	Disturbance of activity and attention	ความผิดปกติของกิจกรรมและความพอใจ
F901	Hyperkinetic conduct disorder	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ และกลุ่มอาการพฤติกรรมก้าวร้าว
F908	Other hyperkinetic disorders	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติอื่น ๆ
F909	Hyperkinetic disorder, unspecified	กลุ่มอาการเคลื่อนไหวมากผิดปกติ สาเหตุที่มีได้ระบุรายละเอียด

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 8. ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ(workload)

B หมายถึง จำนวนผู้ป่วยคาดประมาณจากความชุกที่ได้จากการสำรวจ(คน)  
A หมายถึง จำนวนผู้ป่วยสะสมทั้งหมดที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัด/AHB(คน)

ผู้ป่วยโรคออทิสติกเข้าถึงบริการ หมายถึง ประชากรเด็กอายุ 2-5 ปี (11 เดือน 29 วัน)

ที่มีอาการสอดคล้องกับโรคออทิสติกจากแฟ้ม **Diagnosis\_opd**

ที่มีรหัสการวินิจฉัยเป็น **F84.0 -F84.9** ทั้งรายเก่าและ**รายใหม่**

```
SELECT CODE,NAME,tname
FROM icd101
WHERE CODE BETWEEN 'F84' and 'F849'
```

CODE	NAME
F84	Pervasive developmental disorders
F840	Childhood autism
F841	Atypical autism
F842	Rett's syndrome
F843	Other childhood disintegrative disorder
F844	Overactive disorder associated with mental retardation and stereotyped movements
F845	Asperger's syndrome
F848	Other pervasive developmental disorders
F849	Pervasive developmental disorder, unspecified

แฟ้ม **Person + service +Diagnosis\_Opd**

NATION in(99)

DISCHARGE in(9)

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 9. จำนวนผู้ป่วยนอกจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ

สิทธิได้จากแพ้ม **service** คนหนึ่งคนสามารถมารับบริการได้หลายครั้งในหนึ่งปี ในแต่ละครั้งอาจใช้สิทธิแตกต่างกัน ดังนั้นคลอลัมน์รวมมิได้เกิดจากการนำคลอลัมน์แต่ละสิทธิมารวมกัน

แพ้ม Person

+ service ตามประเภทสิทธิการรักษา Card

+ Diagnosis\_Opd

```
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F00' AND 'F03' ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F00' AND 'F09' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F10' AND 'F10' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F17' AND 'F17' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F10' AND 'F19' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F20' AND 'F20' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F20' AND 'F29' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F31' AND 'F31' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) IN('F32','F33','F38','F39')  
OR SUBSTR(DIAGCODE,1,4) IN('F341')  
AND SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F30' AND 'F39' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F40' AND 'F48' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F50' AND 'F59' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F60' AND 'F69' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F70' AND 'F79' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F81' AND 'F81' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F84' AND 'F84' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F80' AND 'F89' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F90' AND 'F90' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F90' AND 'F98' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F99' AND 'F99' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'X60' AND 'X84' AND ;
```

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

## 10. จำนวนผู้ป่วยในจิตเวชที่มารับบริการจำแนกรายกลุ่มโรคและสิทธิ

สิทธิได้จากแพ้ม **service** คนหนึ่งคนสามารถมารับบริการได้หลายครั้งในหนึ่งปี ในแต่ละครั้งอาจใช้สิทธิแตกต่างกัน ดังนั้นคลอลัมน์รวมมิได้เกิดจากการนำคลอลัมน์แต่ละสิทธิมารวมกัน

แพ้ม Person

+ service ตามประเภทสิทธิการรักษา Card

+ Diagnosis\_Ipd

```
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F00' AND 'F03' ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F00' AND 'F09' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F10' AND 'F10' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F17' AND 'F17' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F10' AND 'F19' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F20' AND 'F20' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F20' AND 'F29' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F31' AND 'F31' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) IN('F32','F33','F38','F39')  
OR SUBSTR(DIAGCODE,1,4) IN('F341')  
AND SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F30' AND 'F39' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F40' AND 'F48' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F50' AND 'F59' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F60' AND 'F69' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F70' AND 'F79' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F81' AND 'F81' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F84' AND 'F84' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F80' AND 'F89' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F90' AND 'F90' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F90' AND 'F98' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'F99' AND 'F99' AND ;  
SUBSTR(DIAGCODE,1,3) BETWEEN 'X60' AND 'X84' AND ;
```

# ข้อมูลเพื่อตอบสนอง Service Plan สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช

11. ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน

**B=** จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ที่ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือน

- ตัดความซ้ำซ้อนด้วย **hospcode,pid** นับอายุตามการมารับบริการครั้งสุดท้ายในปีงบประมาณแล้วค้นหาประวัติการรับบริการย้อนหลังไปอีก 6 เดือนว่ามีการรับบริการด้วยรหัสวินิจฉัยโรคตามระบุหรือไม่ คือ **F32.x, F33.x, F34.1, F38.x** และ **F39.x** อย่างน้อย 2 ครั้งขึ้นไปหรือไม่ หากพบประวัติการรับบริการที่มีรหัส **F** ดังกล่าวอย่างน้อย 2 ครั้งในรอบ 6 เดือนจะถือว่าเป็นเป้าหมาย

**A =** จำนวนผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการดูแลตามแนวทางมาตรฐานจากหน่วยบริการต่อเนื่องเป็นเวลา 6 เดือนและมีค่าคะแนน **9Q** น้อยกว่า 7 อย่างน้อย 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน

- ในช่วงการรับบริการในตัวหารจะต้องมีการคัดกรอง **9Q** ลงในแฟ้ม **specialpp** ผลปกติ รหัส **1B0260** ในอายุต่ำกว่า 60 ปีและ **1B0282** ในกลุ่มผู้สูงอายุ อย่างน้อย 2 ครั้ง จึงนับผลงาน

แฟ้ม **Person**

+ **service + Diagnosis\_Ipd**

+**ppspacial**



END